## Series OSR



परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 11 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 29 प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains **11** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **29** questions.
- Please write down the Serial Number of the question before attempting it.
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

# गणित

## MATHEMATICS

निर्धारित समय : 3 घण्टे Time allowed : 3 hours अधिकतम अंक : 100 Maximum Marks : 100

## सामान्य निर्देशः

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) इस प्रश्न पत्र में 29 प्रश्न हैं जो तीन खण्डों में विभाजित हैं : अ, ब तथा स । खण्ड अ में
  10 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक एक अंक का है । खण्ड ब में 12 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक चार
  अंक का है । खण्ड स में 7 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक छ: अंक का है ।
- (iii) खण्ड अ में सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, एक वाक्य अथवा प्रश्न की आवश्यकता अनुसार दिए जा सकते हैं।
- (iv) पूर्ण प्रश्न पत्र में विकल्प नहीं हैं । फिर भी चार अंकों वाले 4 प्रश्नों में तथा छः अंकों वाले
  2 प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प है । ऐसे सभी प्रश्नों में से आपको एक ही विकल्प हल करना
  है ।
- (v) कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है । यदि आवश्यक हो तो आप लघुगणकीय सारणियाँ
  माँग सकते हैं ।

## **General Instructions :**

- (i) **All** questions are compulsory.
- (ii) The question paper consists of 29 questions divided into three sections A, B and C. Section A comprises of 10 questions of one mark each, Section B comprises of 12 questions of four marks each and Section C comprises of 7 questions of six marks each.
- (iii) All questions in Section A are to be answered in one word, one sentence or as per the exact requirement of the question.
- (iv) There is no overall choice. However, internal choice has been provided in 4 questions of four marks each and 2 questions of six marks each. You have to attempt only one of the alternatives in all such questions.
- (v) Use of calculators is **not** permitted. You may ask for logarithmic tables, if required.

## खण्ड अ

#### SECTION A

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है । Question numbers 1 to 10 carry 1 mark each.

1.यदि N पर 
$$R = \{(x, y) : x + 2y = 8\}$$
 एक संबंध है, तो R का परिसर लिखिए |If  $R = \{(x, y) : x + 2y = 8\}$  is a relation on N, write the range of R.

2. यदि 
$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \frac{\pi}{4}$$
,  $xy < 1$  है, तो  $x + y + xy$  का मान लिखिए ।

If  $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \frac{\pi}{4}$ , xy < 1, then write the value of x + y + xy.

**3.** यदि A एक ऐसा वर्ग आव्यूह है कि  $A^2 = A$  है, तो  $7A - (I + A)^3$  का मान लिखिए, जहाँ I एक तत्समक आव्यूह है ।

If A is a square matrix such that  $A^2 = A$ , then write the value of  $7A - (I + A)^3$ , where I is an identity matrix.

4. 
$$\operatorname{ucl} \begin{bmatrix} x - y & z \\ 2x - y & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \overset{\circ}{k}, \ \overrightarrow{n} x + y \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \ \overrightarrow{m} \ \overrightarrow{m$$

65/1

6. 
$$\operatorname{alg} f(x) = \int_{0}^{x} t \sin t \, dt$$
  $\overline{\mathfrak{R}}$ ,  $\operatorname{ch} f'(x)$  का मान ज्ञात कीजिए  
If  $f(x) = \int_{0}^{x} t \sin t \, dt$ , then write the value of  $f'(x)$ .

7. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_{2}^{4} \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

Evaluate :

$$\int_{2}^{4} \frac{x}{x^2+1} dx$$

8. 'p' का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश  $3\hat{i} + 2\hat{j} + 9\hat{k}$  तथा  $\hat{i} - 2p\hat{j} + 3\hat{k}$  समांतर हैं ।

Find the value of 'p' for which the vectors  $3\hat{i} + 2\hat{j} + 9\hat{k}$  and  $\hat{i} - 2p\hat{j} + 3\hat{k}$  are parallel.

9.  $\overrightarrow{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}, \quad \overrightarrow{b} = -\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k} \quad \overrightarrow{av} \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{a} \cdot (\overrightarrow{b} \times \overrightarrow{c}) \quad \overrightarrow{an} \quad \overrightarrow{b} = -\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k} \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{a} \cdot (\overrightarrow{b} \times \overrightarrow{c}) \quad \overrightarrow{an} \quad \overrightarrow{bn} = -\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k} \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + \hat{j} + 2\hat{k} \quad \overrightarrow{\epsilon}, \quad \overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} +$ 

Find  $\overrightarrow{a} \cdot (\overrightarrow{b} \times \overrightarrow{c})$ , if  $\overrightarrow{a} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ ,  $\overrightarrow{b} = -\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  and  $\overrightarrow{c} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ .

10. यदि एक रेखा के कार्तीय समीकरण  $\frac{3-x}{5} = \frac{y+4}{7} = \frac{2z-6}{4}$  हैं, तो उस रेखा का सदिश समीकरण लिखिए ।

If the cartesian equations of a line are  $\frac{3-x}{5} = \frac{y+4}{7} = \frac{2z-6}{4}$ , write the vector equation for the line.

#### SECTION B

प्रश्न संख्या 11 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है । Question numbers 11 to 22 carry 4 marks each.

- 11. यदि फलन  $f: R \to R$ ,  $f(x) = x^2 + 2$  तथा  $g: R \to R$ ,  $g(x) = \frac{x}{x-1}$ ,  $x \neq 1$  द्वारा प्रदत्त हैं, तो fog तथा gof ज्ञात कीजिए और अतः fog (2) तथा gof (-3) ज्ञात कीजिए | If the function  $f: R \to R$  be given by  $f(x) = x^2 + 2$  and  $g: R \to R$  be given by  $g(x) = \frac{x}{x-1}$ ,  $x \neq 1$ , find fog and gof and hence find fog (2) and gof (-3).
- 12. सिद्ध कीजिए कि

$$\tan^{-1}\left[\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}\right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cos^{-1}x, \quad \frac{-1}{\sqrt{2}} \le x \le 1$$

यदि 
$$\tan^{-1}\left(\frac{x-2}{x-4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+2}{x+4}\right) = \frac{\pi}{4}$$
 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए ।

Prove that

$$\tan^{-1}\left[\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}\right] = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\cos^{-1}x, \quad \frac{-1}{\sqrt{2}} \le x \le 1$$

OR

If  $\tan^{-1}\left(\frac{x-2}{x-4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+2}{x+4}\right) = \frac{\pi}{4}$ , find the value of x.

13. सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, सिद्ध कीजिए कि

$$\begin{vmatrix} x + y & x & x \\ 5x + 4y & 4x & 2x \\ 10x + 8y & 8x & 3x \end{vmatrix} = x^{3}$$

65/1

Using properties of determinants, prove that

$$\begin{vmatrix} x + y & x & x \\ 5x + 4y & 4x & 2x \\ 10x + 8y & 8x & 3x \end{vmatrix} = x^{3}$$

**14.** यदि  $x = ae^{\theta} (\sin \theta - \cos \theta)$  तथा  $y = ae^{\theta} (\sin \theta + \cos \theta)$  है, तो  $\theta = \frac{\pi}{4}$  पर  $\frac{dy}{dx}$ का मान ज्ञात कीजिए ।

Find the value of  $\frac{dy}{dx}$  at  $\theta = \frac{\pi}{4}$ , if  $x = ae^{\theta} (\sin \theta - \cos \theta)$  and  $y = ae^{\theta} (\sin \theta + \cos \theta)$ .

15. यदि  $y = Pe^{ax} + Qe^{bx}$  है, तो दर्शाइए कि $\frac{d^2y}{dx^2} - (a+b)\frac{dy}{dx} + aby = 0.$ 

If 
$$y = Pe^{ax} + Qe^{bx}$$
, show that

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - (a+b) \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + aby = 0.$$

16. x के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए  $y = [x (x - 2)]^2$  एक वर्धमान फलन है।

#### अथवा

वक्र $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$  के बिन्दु  $(\sqrt{2}\,a,\,b)$  पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए ।

Find the value(s) of x for which  $y = [x (x - 2)]^2$  is an increasing function.

#### OR

Find the equations of the tangent and normal to the curve  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  at the point ( $\sqrt{2}$  a, b).

17. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_{0}^{\pi} \frac{4x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, \mathrm{d}x$$

अथवा

मान ज्ञात कीजिए :

$$\int\!\frac{x+2}{\sqrt{x^2+5x+6}}\ dx$$

Evaluate :

$$\int_{0}^{\pi} \frac{4x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, \mathrm{d}x$$



Evaluate :

$$\int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+5x+6}} \ dx$$

18. अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = 1 + x + y + xy$  का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया गया है कि जब x = 1 है, तो y = 0 है ।

Find the particular solution of the differential equation  $\frac{dy}{dx} = 1 + x + y + xy$ , given that y = 0 when x = 1.

19. अवकल समीकरण 
$$(1 + x^2) \frac{dy}{dx} + y = e^{\tan^{-1}x}$$
 को हल कीजिए।

Solve the differential equation  $(1 + x^2) \frac{dy}{dx} + y = e^{\tan^{-1}x}$ .

65/1

**20.** दर्शाइए कि चार बिन्दु A, B, C तथा D, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः  $4\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ ,  $-\hat{j} - \hat{k}, 3\hat{i} + 9\hat{j} + 4\hat{k}$  तथा  $4(-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  हैं, समतलीय हैं ।

#### अथवा

सदिश  $\overrightarrow{a} = \widehat{i} + \widehat{j} + \widehat{k}$  का सदिशों  $\overrightarrow{b} = 2\widehat{i} + 4\widehat{j} - 5\widehat{k}$  तथा  $\overrightarrow{c} = \lambda\widehat{i} + 2\widehat{j} + 3\widehat{k}$  के योगफल की दिशा में एक मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है ।  $\lambda$  का मान ज्ञात कीजिए और अतः  $\overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}$  की दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए ।

Show that the four points A, B, C and D with position vectors  $4\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ ,  $-\hat{j} - \hat{k}$ ,  $3\hat{i} + 9\hat{j} + 4\hat{k}$  and  $4(-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  respectively are coplanar.

#### OR

The scalar product of the vector  $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$  with a unit vector along the sum of vectors  $\vec{b} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$  and  $\vec{c} = \lambda\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$  is equal to one. Find the value of  $\lambda$  and hence find the unit vector along  $\vec{b} + \vec{c}$ .

21. एक रेखा बिन्दु (2, -1, 3) से होकर जाती है तथा रेखाओं  $\overrightarrow{r} = (\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$  तथा  $\overrightarrow{r} = (2\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}) + \mu(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})$  पर लंबवत् है । उसका समीकरण, सदिश तथा कार्तीय रूप में ज्ञात कीजिए ।

A line passes through (2, -1, 3) and is perpendicular to the lines  $\vec{r} = (\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$  and

 $\vec{r} = (2\hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}) + \mu(\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k})$ . Obtain its equation in vector and cartesian form.

22. एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से तीन गुना है । प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले पाँच परीक्षणों में से कम-से-कम 3 सफल होंगे ।

An experiment succeeds thrice as often as it fails. Find the probability that in the next five trials, there will be at least 3 successes.

### खण्ड स

## SECTION C

प्रश्न संख्या 23 से 29 तक प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक हैं । Question numbers 23 to 29 carry 6 marks each.

23. दो विद्यालय A तथा B अपने चुने हुए विद्यार्थियों को निष्कपटता, सत्यवादिता तथा सहायकता के मूल्यों पर पुरस्कार देना चाहते हैं । विद्यालय A अपने क्रमशः 3, 2 तथा 1 विद्यार्थियों को इन तीन मूल्यों के लिए प्रत्येक को क्रमशः ₹ x, ₹ y तथा ₹ z देना चाहता है जबकि इन पुरस्कारों का कुल मूल्य ₹ 1,600 है । विद्यालय B अपने क्रमशः 4, 1 तथा 3 विद्यार्थियों को इन मूल्यों के लिए कुल ₹ 2,300 पुरस्कार स्वरूप देना चाहता है (तथा पहले विद्यालय जैसे ही तीन मूल्यों पर वही पुरस्कार राशि देना चाहता है) । यदि इन तीनों मूल्यों पर दिए गए एक-एक पुरस्कार की कुल राशि ₹ 900 है, तो आव्यूहों का प्रयोग करके प्रत्येक मूल्य के लिए दी गई पुरस्कार राशि इता कीजिए । उपर्युक्त तीन मूल्यों के अतिरिक्त एक अन्य मूल्य सुझाइए, जो पुरस्कार देने के लिए शामिल करना चाहिए ।

Two schools A and B want to award their selected students on the values of sincerity, truthfulness and helpfulness. The school A wants to award  $\overline{\mathbf{x}}$  x each,  $\overline{\mathbf{x}}$  y each and  $\overline{\mathbf{x}}$  z each for the three respective values to 3, 2 and 1 students respectively with a total award money of  $\overline{\mathbf{x}}$  1,600. School B wants to spend  $\overline{\mathbf{x}}$  2,300 to award its 4, 1 and 3 students on the respective values (by giving the same award money to the three values as before). If the total amount of award for one prize on each value is  $\overline{\mathbf{x}}$  900, using matrices, find the award money for each value. Apart from these three values, suggest one more value which should be considered for award.

24. दर्शाइए कि एक r त्रिज्या के गोले के अन्तर्गत अधिकतम आयतन वाले लंब-वृत्तीय शंकु की ऊँचाई  $\frac{4r}{3}$  है । यह भी दर्शाइए कि इस शंकु का अधिकतम आयतन गोले के आयतन का  $\frac{8}{27}$  होता है ।

Show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is  $\frac{4r}{3}$ . Also show that the maximum volume of the cone is  $\frac{8}{27}$  of the volume of the sphere.

**25.** मान ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{1}{\cos^4 x + \sin^4 x} \, \mathrm{d}x$$

Evaluate :

$$\int \frac{1}{\cos^4 x + \sin^4 x} \, \mathrm{d}x$$

26. समाकलन का प्रयोग करके एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो शीर्षों (-1, 2), (1, 5) तथा (3, 4) द्वारा घिरा है।

Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are (-1, 2), (1, 5) and (3, 4).

27. समतलों x + y + z = 1 तथा 2x + 3y + 4z = 5 की प्रतिच्छेदन रेखा को अन्तर्विष्ट करने वाले तथा समतल x - y + z = 0 के लंबवत् समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए । उपर्युक्त ज्ञात किए गए समतल की मूल-बिन्दु से दूरी भी ज्ञात कीजिए ।

#### अथवा

रेखा  $\vec{r} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k} + \lambda(3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k})$  तथा समतल  $\vec{r} \cdot (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) = 0$  के प्रतिच्छेदन बिन्दु की बिन्दु (2, 12, 5) से दूरी ज्ञात कीजिए।

Find the equation of the plane through the line of intersection of the planes x + y + z = 1 and 2x + 3y + 4z = 5 which is perpendicular to the plane x - y + z = 0. Also find the distance of the plane obtained above, from the origin.

#### OR

Find the distance of the point (2, 12, 5) from the point of intersection of the line  $\vec{r} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k} + \lambda(3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k})$  and the plane  $\vec{r} \cdot (\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}) = 0$ .

28. एक निर्माणकर्ता कंपनी कक्षा XII के लिए गणित में सहायक शिक्षण सामग्री के दो नमूने A तथा B बनाती है । नमूने A का प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 श्रम घंटा पॉलिश करने में लगाती है, जबकि नमूने B के प्रत्येक नग बनाने में 12 श्रम घंटे तथा पॉलिश करने में 3 श्रम घंटे लगाती है । बनाने तथा पॉलिश करने के लिए प्रति सप्ताह उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे क्रमशः 180 तथा 30 हैं । कंपनी नमूने A के प्रत्येक नग पर ₹ 80 तथा नमूने B के प्रत्येक नग बनाने पर रहे के लितने-कितने नगों का निर्माण प्रति सप्ताह किया जाए कि अधिकतम लाभ हो ? इस प्रश्न को रैखिक प्रोग्रामन समस्या बनाकर ग्राफ द्वारा हल कीजिए । प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है ?

A manufacturing company makes two types of teaching aids A and B of Mathematics for class XII. Each type of A requires 9 labour hours of fabricating and 1 labour hour for finishing. Each type of B requires 12 labour hours for fabricating and 3 labour hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labour hours available per week are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of ₹ 80 on each piece of type A and ₹ 120 on each piece of type B. How many pieces of type A and type B should be manufactured per week to get a maximum profit ? Make it as an LPP and solve graphically. What is the maximum profit per week ?

29. तीन सिके हैं । एक सिके के दोनों ओर चित ही है, दूसरा सिका अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है तथा तीसरा सिका भी अभिनत है जिसमें पट 40% बार प्रकट होता है । तीन सिकों में से यादृच्छया एक सिका चुनकर उछाला गया । यदि सिके पर चित प्रकट हो, तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों ओर चित वाला सिका है ?

## अथवा

प्रथम छ: धन पूर्णांकों में से दो संख्याएँ यादृच्छया (बिना प्रतिस्थापन) चुनी गईं । माना X दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या व्यक्त करता है । यादृच्छिक चर X का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए तथा इस बंटन का माध्य भी ज्ञात कीजिए ।

There are three coins. One is a two-headed coin (having head on both faces), another is a biased coin that comes up heads 75% of the times and third is also a biased coin that comes up tails 40% of the times. One of the three coins is chosen at random and tossed, and it shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin ?

## OR

Two numbers are selected at random (without replacement) from the first six positive integers. Let X denote the larger of the two numbers obtained. Find the probability distribution of the random variable X, and hence find the mean of the distribution.