

SSLC MODEL EXAMINATION 2026

ഗണിതം - ഉത്തരസൂചിക

ME 530

Qn no	Key	Score
SECTION A		
1	(c) 35	1
2	(b) (0,3)	1
3	(d) $4n + 3$	1
4	(a) (2,7)	1
5	(d) 60	1
6	(b) 90	1
7	(c) (ii) , (iii)	1
8	(d) പ്രസ്താവന 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ് . പ്രസ്താവന 1 ന്റെ കാരണമാണ് പ്രസ്താവന 2 .	1
SECTION B		
9	$\begin{aligned} \text{സാധ്യത} &= \frac{30}{360} + \frac{40}{360} + \frac{50}{360} \\ &= \frac{120}{360} = \frac{1}{3} \end{aligned}$	1 1
10A	(i) ആപ്പിൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത $= \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$	1
	(ii) ഓറഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത $= \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$	1
	(iii) 10 ആപ്പിളുകൾ കൂടി ഇട്ടതിനു ശേഷം ഓറഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത $= \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$	1
10B	(i) $15 \times 16 = 240$	1
	(ii) രണ്ടും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= \frac{7 \times 6}{240} = \frac{42}{240} = \frac{7}{40}$	1
	(iii) ഒന്നെങ്കിലും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= 1 - \text{രണ്ടും നീലയാകാനുള്ള സാധ്യത}$ $= 1 - \frac{8 \times 10}{240} = \frac{160}{240} = \frac{2}{3}$	1
	അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും വെളുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത $= \frac{(7 \times 6) + (7 \times 10) + (8 \times 6)}{240} = \frac{160}{240} = \frac{2}{3}$	1
11A	(i) $x_4 = \frac{140}{7} = 20$	1
	(ii) $x_5 = 25$	$\left[x_4 + x_5 = \frac{180}{4} = 45 \right]$
	$x_5 = 20 + 5 = 25$	അല്ലെങ്കിൽ $\left[x_8 = 180 - 140 = 40 , 4d = 20 , d = 5 \right]$
	(iii) തുക $= 5(25 + 30) = 275$	$\left[\text{തുക} = 5(x_5 + x_6) \right]$
11B	(i) $\frac{15 \times 16}{2} = 120$	1
	(ii) $x_n = 6n + 1$	1

$$\begin{aligned} \text{തുക} &= 6 \times \frac{15 \times 16}{2} + (1 \times 15) \\ &= (6 \times 120) + 15 = 735 \end{aligned}$$

$$\left[\text{തുക} = 6 \times \frac{n(n+1)}{2} + (1 \times n) \right]$$

1
1

12

ദിവസക്കൂലി	തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം
500 നേക്കാൾ കുറവ്	7
600 നേക്കാൾ കുറവ്	15
700 നേക്കാൾ കുറവ്	25
800 നേക്കാൾ കുറവ്	34
900 നേക്കാൾ കുറവ്	39
1000 നേക്കാൾ കുറവ്	43

$$N = 43$$

(i) മധ്യമദിവസക്കൂലി = 22 -) മത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലി = x_{22}


$$\text{മധ്യമ വിലാസം} = 600 - 700$$

മധ്യമ വിലാസത്തിൽ 10 തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട്.

600 മുതൽ 700 വരെയുള്ള 100 രൂപയെ 10 തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കുക.

$$\text{ഒരു ഉപവിലാസത്തിന്റെ നീളം} = \frac{100}{10} = 10 = d$$

ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഉപവിലാസത്തിന്റെയും കൃത്യം നടപ്പിലാണ് മധ്യമവിലാസത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസക്കൂലികൾ വരുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക.



(ii) 16 -) മത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലി = $x_{16} = \frac{600 + 610}{2} = 605$ രൂപ

മധ്യമവിലാസത്തിൽ വരുന്ന ദിവസക്കൂലികൾ സമാന്തരശ്രേണിയിലാണ് .


(iii) മധ്യമദിവസക്കൂലി = $x_{22} = 605 + (6 \times 10) = 665$ രൂപ

1
1
1
1
1

SECTION C



13





(i) മധ്യബിന്ദുവിന്റെ സൂചകസംഖ്യകൾ = $\left(\frac{1+9}{2}, \frac{2+10}{2} \right) = (5, 6)$




P യുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ = (3,4)

1
1
1

	അല്ലെങ്കിൽ	
	$x_n = 3n + 1$ $x_n^2 = (3n + 1)^2 = 9n^2 + 6n + 1 = 3(3n^2 + 2n) + 1$ <p>ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളെ 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്യം 1 തന്നെ കിട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളെല്ലാം ഇതേ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളായിരിക്കും.</p>	$[x_n = dn + f - d]$
17A	(i) $3 + 6 + 9 + \dots + 60 = 3(1 + 2 + 3 + \dots + 20)$ $= 3 \times \frac{20 \times 21}{2} = 630$ (ii) $6 + 12 + 18 + \dots + 120 = 2(3 + 6 + 9 + \dots + 60) = 2 \times 630 = 1260$ (iii) $1260 + (20 \times 2) = 1300$	1 1 1 1
17B	(i) $x_2 + x_{29} = 60$ (ii) $x_{15} + x_{16} = 60$ (iii) തുക = $15 \times 60 = 900$	$[x_1 + x_{30} = x_2 + x_{29}]$ $[x_1 + x_{30} = x_2 + x_{29} = x_{15} + x_{16}]$ 1 1 1
18	(i) ചെറിയ വശത്തിന്റെ നീളം = x \implies വലിയ വശത്തിന്റെ നീളം = $x + 6$ $(x + 6)^2 + x^2 = 30^2 \implies 2x^2 + 12x + 36 = 900$ (ii) $2x^2 + 12x = 900 - 36 = 864$ $x^2 + 6x = 432$ $x^2 + 6x + 3^2 = 432 + 3^2$ $(x + 3)^2 = 441$ $x + 3 = \sqrt{441} = 21 \implies x = 18$ വശങ്ങളുടെ നീളം = 18 സെ.മീ. , 24 സെ.മീ.	 1 1 1 1
19	(i) $3 \times 5^2 + (6 \times 5) = 75 + 30 = 105$ (ii) $3n^2 + 6n = 360 \implies 3(n^2 + 2n) = 3 \times 120 \implies n^2 + 2n = 120$ $n^2 + 2n + 1^2 = 120 + 1^2 \implies (n + 1)^2 = 121$ $n + 1 = \sqrt{121} = 11 \implies n = 10$ അല്ലെങ്കിൽ $3 \times 10^2 + (6 \times 10) = 360$ \therefore പദങ്ങളുടെ എണ്ണം = 10	1 1 1 1
SECTION E		
20A	OA യോജിപ്പിച്ചാൽ , (i) $\angle OAB = \angle OBA = 30^\circ$ $[OA = OB]$ $\angle OAC = \angle OCA = 20^\circ$ $[OA = OC]$ $\angle BAC = \angle OAB + \angle OAC = 30 + 20 = 50^\circ$ (ii) $\angle BOC = 2 \times 50 = 100^\circ$ $[\angle BOC = 2 \times \angle BAC]$	 1 1 1

20B	<p>(i) $\angle OAC = \frac{x^0}{2}$ $[\angle BAC = x^0]$</p> <p>(ii) $\angle OAC + \angle OCA = \frac{180 - 50}{2} = 65^0$</p> <p>$\angle AOC = 180 - \frac{130}{2} = 180 - 65 = 115^0$</p>		1 1 1
21	<p>(i) $\angle BCD = 180 - 80 = 100^0$ [ചക്രിയചതുർഭുജത്തിന്റെ എതിർ കോണുകളുടെ തുക 180^0]</p> <p>$\angle CBE = 180 - 70 = 110^0$</p> <p>[$\angle ABC = 180 - 110 = 70^0$]</p> <p>(ii) $\angle CBE = x^0$ എന്നെടുത്താൽ</p> <p>$\angle ABC = 180 - x^0$</p> <p>$\implies \angle ADC = x^0$</p>		1 1 1 1
22A	<p>(i) $AS = AP = 3$ സെ.മീ.</p> <p>(ii) $BP = BQ$</p> <p>$CQ = CR$</p> <p>$DR = DS$</p> <p>$AB + CD = AP + BP + CR + DR$</p> <p>$= AS + BQ + CQ + DS$</p> <p>$= (AS + DS) + (BQ + CQ)$</p> <p>$= AD + BC$</p>		1 1 1 1 1
22B	<p>ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമാണ്.</p> <p>$2r = 6 + 8 - 10 \implies 2r = 4$</p> <p>$r = 2$ സെ.മീ.</p> <p style="text-align: center;">അല്ലെങ്കിൽ</p> <p>ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമാണ്.</p> <p>ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$ ച.സെ.മീ.</p> <p>ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് $= 6 + 8 + 10 = 24$ സെ.മീ.</p> <p>$r = \frac{A}{S} = \frac{24}{12} = 2$ സെ.മീ.</p>		1 1 1
23	<p>(i) $\angle BAC = 90^0$</p> <p>(ii) $r = \frac{5}{2 \times 0.6428}$ സെ.മീ.</p> <p>[$\sin 40^0 = \frac{5}{2r}$ അല്ലെങ്കിൽ $\cos 50^0 = \frac{5}{2r}$]</p> <p>(iii) $AB = 5 \times 1.1918$ സെ.മീ.</p> <p>[$\tan 50^0 = \frac{AB}{5}$]</p> <p>ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് $= 5 + (5 \times 1.1918) + \frac{5}{0.6428}$ സെ.മീ.</p>		1 1 1 1

24A (i)



1

(ii) വലിയ മട്ടത്രികോണത്തിൽ , $\tan 40^\circ = \frac{30 - x}{x} \implies 0.8391 = \frac{30 - x}{x}$
 $0.8391x = 30 - x \implies 1.8391x = 30 \implies x = \frac{30}{1.8391}$

1

തൂണിന്റെ ഉയരം = $\frac{30}{1.8391}$ മീ.

1

അല്ലെങ്കിൽ

വലിയ മട്ടത്രികോണത്തിൽ , $\tan 50^\circ = \frac{x}{30 - x} \implies 1.1918 = \frac{x}{30 - x}$
 $1.1918(30 - x) = x \implies 2.1918x = 1.1918 \times 30 \implies x = \frac{1.1918 \times 30}{2.1918}$

1


തൂണിന്റെ ഉയരം = $\frac{1.1918 \times 30}{2.1918}$ മീ.

അല്ലെങ്കിൽ

$2r = \frac{30}{\sin 85^\circ} = \frac{30}{0.9962}$ മീ. [$BC = 2r \sin 85^\circ$]


$AB = 2r \sin 50^\circ = \frac{30}{0.9962} \times 0.7660$ മീ.

$AD = \frac{1}{\sqrt{2}} \times AB$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{30}{0.9962} \times 0.7660$ മീ.




24B (i) $h = 6 \times \sin 35^\circ = 6 \times 0.5736$ സെ.മീ.

ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് = $\frac{1}{2} \times 10 \times 6 \times 0.5736$
 $= 30 \times 0.5736$ ച.സെ.മീ.



(ii) ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് = 30×0.5736 ച.സെ.മീ.



25A (i) ചരിവുയരം = $\sqrt{25^2 - 15^2} = 20$ സെ.മീ.

(ii) ഉയരം = $\sqrt{20^2 - 15^2} = \sqrt{175} = 5\sqrt{7}$ സെ.മീ.



(iii) വ്യാപ്തം = $\frac{1}{3} \times 30^2 \times 5\sqrt{7} = 1500\sqrt{7}$ ഘന.സെ.മീ.

$\left[\left(\frac{a}{2} \right)^2 + l^2 = e^2 \right]$
 $\left[\left(\frac{a}{2} \right)^2 + h^2 = l^2 \right]$
 $\left[V = \frac{1}{3} a^2 h \right]$

1

2

2

25B	<p>(i) ചരിവുയരം = 25 സെ.മീ.</p> <p>(ii) $r = \frac{216}{360} \times 25 = 15$ സെ.മീ.</p> <p>(iii) ഉയരം = $\sqrt{25^2 - 15^2} = 20$ സെ.മീ.</p> <p>വ്യാപ്തം = $\frac{1}{3} \times \pi \times 15^2 \times 20 = 1500\pi$ ഘന.സെ.മീ.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>
26	<p>ആരം 3 സെ.മീ. ആയ വൃത്തം വരച്ച് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും 7 സെ.മീ. അകലെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന്.</p> <p>ഈ 7 സെ.മീ നീളമുള്ള വര വ്യാസമായി വലിയ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് .</p> <p>വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വൃത്തങ്ങൾ കുട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് വരകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് .</p> <p>തൊടുവരകളുടെ നീളം അളന്നെഴുതുന്നതിന്.</p> 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
27	<p>തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ചതുരം വരയ്ക്കുന്നതിന് .</p> <p>വലിയ വശത്തോട് ചെറിയ വശം നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നതിന് .</p> <p>ഈ വര വ്യാസമായി വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതിന് .</p> <p>സമചതുരം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് .</p> 	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>

അല്ലെങ്കിൽ

